

Oznakowanie opakowania bezpośredniego

(butelka PE, 500 g)

Opakowanie przeznaczone do stosowania w lecznictwie zamkniętym

Parafina ciekła - Avena

Paraffinum liquidum

Płyn doustny i na skórę, 1g/ 1g

Zawartość opakowania: 500 g

Skład:

1 g płynu zawiera 1 g parafiny ciekłej.

Wskazania:

Środek przeczyszczający stosowany w zaparciach wg wskazań lekarza.

Zewnętrznie do nacierania skóry.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na parafinę ciekłą. Ból brzucha o nieustalonej przyczynie oraz ostre stany zapalne przewodu pokarmowego, np. zapalenie wyrostka robaczkowego. Dzieciom i kobietom w ciąży nie należy podawać leku bez porozumienia z lekarzem.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:

Na skórę: brak danych. Doustnie: lek stosowany jest jako doraźny środek przeczyszczający. W przypadku nasilenia się objawów lub nie wystąpienia działania przeczyszczającego w ciągu 1- 2 dni, należy porozumieć się z lekarzem. Długotrwałe i niezgodne z zaleceniami stosowanie leku może prowadzić do zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i wtórnego zaparcia. Należy stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów z przewlekłym stanem zapalnym w obrębie brzucha, a także u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Przypadkowe przedostanie się parafiny do dróg oddechowych może być przyczyną bardzo ciężkiego zapalenia płuc. Zagrożenie dotyczy szczególnie osób w podeszłym wieku, niedołącznych, przyjmujących lek w pozycji leżącej (zachłyśnięcie). U osób w podeszłym wieku należy ograniczyć podawanie leku do sytuacji naprawdę koniecznych, z zastosowaniem minimalnych skutecznych dawek, możliwie krótko (2-3 tygodnie). Z uwagi na ryzyko działań niepożądanych, u osób w podeszłym wieku należy nadzorować czas i częstotliwość stosowania leku.

Interakcje:

Na skórę: brak danych. Doustnie: stosowany lek może zaburzać wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, tj. A, D, E i K oraz równocześnie stosowanych leków doustnych.

Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią:

Na skórę: brak przeciwwskazań. Doustnie: przed użyciem należy porozumieć się z lekarzem.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn:

Lek nie wpływa na sprawność psychofizyczną.

Droga podania i sposób stosowania:

Opakowanie przeznaczone do stosowania w lecznictwie zamkniętym. Produkt powinien być stosowany zgodnie z zaleceniem lekarza.

Przedawkowanie:

Stosowanie dużych dawek może powodować biegunkę.

Działania niepożądane:

Na skórę: dotychczas nie odnotowano. Doustnie: może powodować świąd odbytu, często obserwuje się wycieki parafiny z odbytu. Długotrwale i niezgodnie z zaleceniami stosowanie leku może prowadzić do zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i wtórnego zaparcia. Niewielkie ilości parafiny ciekłej mogą gromadzić się w węzłach chłonnych, powodując zmiany zapalne.

Przechowywanie:

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w ciemnym miejscu. Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

Kategoria dostępności:

OTC - Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

Termin ważności:

(miesiąc, rok)

Podmiot odpowiedzialny:

Laboratorium Farmaceutyczne „Avena” spółka jawna
Sokulska- Dura i Palmowski
ul. Leśna 42, 86-031 Osielsko
tel.: (052) 324 12 12
fax.: (052) 324 12 11

Numer pozwolenia: IL – 3385/LN

Numer serii:

Kod kreskowy EAN UCC: 5909994338548

Informacja podana

systemem Braille’a:

Parafina
ciekła-
Avena



Oznakowanie opakowania bezpośredniego

(butelka PE, 800 g)

Opakowanie przeznaczone do stosowania w lecznictwie zamkniętym

Parafina ciekła - Avena

Paraffinum liquidum

Płyn doustny i na skórę, 1g/ 1g

Zawartość opakowania: 800 g

Skład:

1 g płynu zawiera 1 g parafiny ciekłej.

Wskazania:

Środek przeczyszczający stosowany w zaparciach (wg wskazań lekarza).

Zewnętrznie do nacierania skóry.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na parafinę ciekłą. Ból brzucha o nieustalonej przyczynie oraz ostre stany zapalne przewodu pokarmowego, np. zapalenie wyrostka robaczkowego. Dzieciom i kobietom w ciąży nie należy podawać leku bez porozumienia z lekarzem.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:

Na skórę: brak danych. Doustnie: lek stosowany jest jako doraźny środek przeczyszczający. W przypadku nasilenia się objawów lub nie wystąpienia działania przeczyszczającego w ciągu 1- 2 dni, należy porozumieć się z lekarzem. Długotrwałe i niezgodne z zaleceniami stosowanie leku może prowadzić do zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i wtórnego zaparcia. Należy stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów z przewlekłym stanem zapalnym w obrębie brzucha, a także u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Przypadkowe przedostanie się parafiny do dróg oddechowych może być przyczyną bardzo ciężkiego zapalenia płuc. Zagrożenie dotyczy szczególnie osób w podeszłym wieku, niedołążnych, przyjmujących lek w pozycji leżącej (zachłyśnięcie). U osób w podeszłym wieku należy ograniczyć podawanie leku do sytuacji naprawdę koniecznych, z zastosowaniem minimalnych skutecznych dawek, możliwie krótko (2-3 tygodnie). Z uwagi na ryzyko działań niepożądanych, u osób w podeszłym wieku należy nadzorować czas i częstotliwość stosowania leku.

Interakcje:

Na skórę: brak danych. Doustnie: stosowany lek może zaburzać wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, tj. A, D, E i K oraz równocześnie stosowanych leków doustnych.

Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią:

Na skórę: brak przeciwwskazań. Doustnie: przed użyciem należy porozumieć się z lekarzem.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn:

Lek nie wpływa na sprawność psychofizyczną.

Droga podania i sposób stosowania:

Opakowanie przeznaczone do stosowania w lecznictwie zamkniętym. Lek należy stosować zgodnie z zaleceniem lekarza.

Przedawkowanie:

Stosowanie dużych dawek może powodować biegunkę.

Działania niepożądane:

Na skórę: dotychczas nie odnotowano. Doustnie: może powodować świąd odbytu, często obserwuje się wycieki parafiny z odbytu. Długotrwale i niezgodnie z zaleceniami stosowanie leku może prowadzić do zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i wtórnego zaparcia. Niewielkie ilości parafiny ciekłej mogą gromadzić się w węzłach chłonnych, powodując zmiany zapalne.

Przechowywanie:

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w ciemnym miejscu. Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

Kategoria dostępności:

OTC - Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

Termin ważności:

(miesiąc, rok)

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceutyczne „Avena” spółka jawna
Sokulska- Dura i Palmowski
ul. Leśna 42, 86-031 Osielsko
tel.: (052) 324 12 12
fax.: (052) 324 12 11

Pozwolenie nr IL – 3385/LN

Numer serii:

Kod kreskowy EAN UCC: 5909994338555

Informacja podana

systemem Braille’a:

Parafina
ciekła-
Avena



Oznakowanie opakowania bezpośredniego (butelka, 40 g)

Parafina ciekła - Avena

Paraffinum liquidum

Płyn doustny i na skórę, 1g/ 1g

Zawartość opakowania: 40 g

Skład:

1 g płynu zawiera 1 g parafiny ciekłej.

Wskazania:

Środek przeczyszczający stosowany w zaparciach (wg wskazań lekarza).

Zewnętrznie do nacierania skóry.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na parafinę ciekłą. Ból brzucha o nieustalonej przyczynie oraz ostre stany zapalne przewodu pokarmowego, np. zapalenie wyrostka robaczkowego. Dzieciom i kobietom w ciąży nie należy podawać leku bez porozumienia z lekarzem.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:

Na skórę: brak danych. Doustnie: lek stosowany jest jako doraźny środek przeczyszczający. W przypadku nasilenia się objawów lub nie wystąpienia działania przeczyszczającego w ciągu 1- 2 dni, należy porozumieć się z lekarzem. Długotrwałe i niezgodne z zaleceniami stosowanie leku może prowadzić do zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i wtórnego zaparcia. Należy stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów z przewlekłym stanem zapalnym w obrębie brzucha, a także u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Przypadkowe przedostanie się parafiny do dróg oddechowych może być przyczyną bardzo ciężkiego zapalenia płuc. Zagrożenie dotyczy szczególnie osób w podeszłym wieku, niedołącznych, przyjmujących lek w pozycji leżącej (zachłyśnięcie). U osób w podeszłym wieku należy ograniczyć podawanie leku do sytuacji naprawdę koniecznych, z zastosowaniem minimalnych skutecznych dawek, możliwie krótko (2-3 tygodnie). Z uwagi na ryzyko działań niepożądanych, u osób w podeszłym wieku należy nadzorować czas i częstotliwość stosowania leku.

Interakcje:

Na skórę: brak danych. Doustnie: stosowany lek może zaburzać wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, tj. A, D, E i K oraz równocześnie stosowanych leków doustnych.

Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią:

Na skórę: brak przeciwwskazań. Doustnie: przed użyciem należy porozumieć się z lekarzem.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn:

Lek nie wpływa na sprawność psychofizyczną.

Droga podania i sposób stosowania:

Na skórę: u dorosłych i dzieci nacierać skórę niewielką ilością preparatu według potrzeb. Doustnie: jeśli lekarz nie zaleci inaczej: dorośli – zwykle przed snem 15-30 ml doustnie (co odpowiada 1-2 łyżek stołowych).

Działanie przeczyszczające występuje zazwyczaj po 6–10 godzinach.

Przedawkowanie:

Stosowanie dużych dawek może powodować biegunkę.

Działania niepożądane:

Na skórę: dotychczas nie odnotowano. Doustnie: może powodować świąd odbytu, często obserwuje się wycieki parafiny z odbytu. Długotrwałe i niezgodne z zaleceniami stosowanie leku może prowadzić do zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i wtórnego zaparcia. Niewielkie ilości parafiny ciekłej mogą gromadzić się w węzłach chłonnych, powodując zmiany zapalne.

Przechowywanie:

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w ciemnym miejscu. Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

Kategoria dostępności:

OTC - Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

Termin ważności:

(miesiąc, rok)

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceutyczne „Avena” spółka jawna
Sokulska- Dura i Palmowski
ul. Leśna 42, 86-031 Osielsko
tel.: (052) 324 12 12
fax.: (052) 324 12 11

Numer pozwolenia: IL – 3385/LN

Numer serii:

Kod kreskowy EAN UCC: 5909994338517

**Informacja podana
systemem Braille’a:**

Parafina
ciekła-
Avena



Oznakowanie opakowania bezpośredniego (butelka, 80 g)

Parafina ciekła - Avena

Paraffinum liquidum

Płyn doustny i na skórę, 1g/ 1g

Zawartość opakowania: 80 g

Skład:

1 g płynu zawiera 1 g parafiny ciekłej.

Wskazania:

Środek przeczyszczający stosowany w zaparciach wg wskazań lekarza.

Zewnętrznie do nacierania skóry.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na parafinę ciekłą. Ból brzucha o nieustalonej przyczynie oraz ostre stany zapalne przewodu pokarmowego, np. zapalenie wyrostka robaczkowego. Dzieciom i kobietom w ciąży nie należy podawać leku bez porozumienia z lekarzem.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:

Na skórę: brak danych. Doustnie: lek stosowany jest jako doraźny środek przeczyszczający. W przypadku nasilenia się objawów lub nie wystąpienia działania przeczyszczającego w ciągu 1- 2 dni, należy porozumieć się z lekarzem. Długotrwałe i niezgodne z zaleceniami stosowanie leku może prowadzić do zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i wtórnego zaparcia. Należy stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów z przewlekłym stanem zapalnym w obrębie brzucha, a także u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Przypadkowe przedostanie się parafiny do dróg oddechowych może być przyczyną bardzo ciężkiego zapalenia płuc. Zagrożenie dotyczy szczególnie osób w podeszłym wieku, niedołącznych, przyjmujących lek w pozycji leżącej (zachłyśnięcie). U osób w podeszłym wieku należy ograniczyć podawanie leku do sytuacji naprawdę koniecznych, z zastosowaniem minimalnych skutecznych dawek, możliwie krótko (2-3 tygodnie). Z uwagi na ryzyko działań niepożądanych, u osób w podeszłym wieku należy nadzorować czas i częstotliwość stosowania leku.

Interakcje:

Na skórę: brak danych. Doustnie: stosowany lek może zaburzać wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, tj. A, D, E i K oraz równocześnie stosowanych leków doustnych.

Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią:

Na skórę: brak przeciwwskazań. Doustnie: przed użyciem należy porozumieć się z lekarzem.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn:

Lek nie wpływa na sprawność psychofizyczną.

Droga podania i sposób stosowania:

Na skórę: u dorosłych i dzieci nacierać skórę niewielką ilością preparatu według potrzeb. Doustnie: jeśli lekarz nie zaleci inaczej: dorośli – zwykle przed snem 15-30 ml doustnie (co odpowiada 1-2 łyżek stołowych).

Działanie przeczyszczające występuje zazwyczaj po 6–10 godzinach.

Przedawkowanie:

Stosowanie dużych dawek może powodować biegunkę.

Działania niepożądane:

Na skórę: dotychczas nie odnotowano. Doustnie: może powodować świąd odbytu, często obserwuje się wycieki parafiny z odbytu. Długotrwałe i niezgodne z zaleceniami stosowanie leku może prowadzić do zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i wtórnego zaparcia. Niewielkie ilości parafiny ciekłej mogą gromadzić się w węzłach chłonnych, powodując zmiany zapalne.

Przechowywanie:

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w ciemnym miejscu. Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

Kategoria dostępności:

OTC - Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

Termin ważności:

(miesiąc, rok)

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceutyczne „Avena” spółka jawna
Sokulska- Dura i Palmowski
ul. Leśna 42, 86-031 Osielsko
tel.: (052) 324 12 12
fax.: (052) 324 12 11

Numer pozwolenia: IL – 3385/LN

Numer serii:

Kod kreskowy EAN UCC: 5909994338524

**Informacja podana
systemem Braille’a:**

Parafina
ciekła-
Avena



Oznakowanie opakowania bezpośredniego (butelka, 100 g)

Parafina ciekła - Avena

Paraffinum liquidum

Płyn doustny i na skórę, 1g/ 1g

Zawartość opakowania: 100 g

Skład:

1 g płynu zawiera 1 g parafiny ciekłej.

Wskazania:

Środek przeczyszczający stosowany w zaparciach wg wskazań lekarza.

Zewnętrznie do nacierania skóry.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na parafinę ciekłą. Ból brzucha o nieustalonej przyczynie oraz ostre stany zapalne przewodu pokarmowego, np. zapalenie wyrostka robaczkowego. Dzieciom i kobietom w ciąży nie należy podawać leku bez porozumienia z lekarzem.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania:

Na skórę: brak danych. Doustnie: lek stosowany jest jako doraźny środek przeczyszczający. W przypadku nasilenia się objawów lub nie wystąpienia działania przeczyszczającego w ciągu 1- 2 dni, należy porozumieć się z lekarzem. Długotrwałe i niezgodne z zaleceniami stosowanie leku może prowadzić do zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i wtórnego zaparcia. Należy stosować szczególnie ostrożnie u pacjentów z przewlekłym stanem zapalnym w obrębie brzucha, a także u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

Przypadkowe przedostanie się parafiny do dróg oddechowych może być przyczyną bardzo ciężkiego zapalenia płuc. Zagrożenie dotyczy szczególnie osób w podeszłym wieku, niedołącznych, przyjmujących lek w pozycji leżącej (zachłyśnięcie). U osób w podeszłym wieku należy ograniczyć podawanie leku do sytuacji naprawdę koniecznych, z zastosowaniem minimalnych skutecznych dawek, możliwie krótko (2-3 tygodnie). Z uwagi na ryzyko działań niepożądanych, u osób w podeszłym wieku należy nadzorować czas i częstotliwość stosowania leku.

Interakcje:

Na skórę: brak danych. Doustnie: stosowany lek może zaburzać wchłanianie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach, tj. A, D, E i K oraz równocześnie stosowanych leków doustnych.

Stosowanie leku podczas ciąży i karmienia piersią:

Na skórę: brak przeciwwskazań. Doustnie: przed użyciem należy porozumieć się z lekarzem.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn:

Lek nie wpływa na sprawność psychofizyczną.

Droga podania i sposób stosowania:

Na skórę: u dorosłych i dzieci nacierać skórę niewielką ilością preparatu według potrzeb. Doustnie: jeśli lekarz nie zaleci inaczej: dorośli – zwykle przed snem 15-30 ml doustnie (co odpowiada 1-2 łyżek stołowych).

Działanie przeczyszczające występuje zazwyczaj po 6–10 godzinach.

Przedawkowanie:

Stosowanie dużych dawek może powodować biegunkę.

Działania niepożądane:

Na skórę: dotychczas nie odnotowano. Doustnie: może powodować świąd odbytu, często obserwuje się wycieki parafiny z odbytu. Długotrwałe i niezgodne z zaleceniami stosowanie leku może prowadzić do zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i wtórnego zaparcia. Niewielkie ilości parafiny ciekłej mogą gromadzić się w węzłach chłonnych, powodując zmiany zapalne.

Przechowywanie:

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w ciemnym miejscu. Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

Kategoria dostępności:

OTC - Produkt leczniczy wydawany bez recepty.

Termin ważności:

(miesiąc, rok)

Podmiot odpowiedzialny: Laboratorium Farmaceutyczne „Avena” spółka jawna
Sokulska- Dura i Palmowski
ul. Leśna 42, 86-031 Osielsko
tel.: (052) 324 12 12
fax.: (052) 324 12 11

Numer pozwolenia: IL – 3385/LN

Numer serii:

Kod kreskowy EAN UCC: 5909994338531

**Informacja podana
systemem Braille’a:**

Parafina
ciekła-
Avena

