

## INFORMACJE ZAMIESZCZANE NA OPAKOWANIACH BEZPOŚREDNICH

Butelka ze szkła brązowego – 150 ml

### 1. NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO

**WAMAG**

**115,6 mg jonów wapnia + 25,5 mg jonów magnezu/5 ml, syrop**

*Calcii glubionas anhydricus + Calcii lactobionas dihydricus + Magnesii lactas dihydricus*

### 2. ZAWARTOŚĆ SUBSTANCJI CZYNNEJ

#### Skład

100 ml syropu zawiera

*substancje czynne:*

wapnia glukonolaktobionian bezwodny (*Calcii glubionas anhydricus*) 29,4 g

wapnia laktobionian dwuwodny (*Calcii lactobionas dihydricus*) 6,4 g

(co odpowiada 2,312 g jonów wapnia)

magnezu mleczan dwuwodny (*Magnesii lactas dihydricus*) 5,0 g

(co odpowiada 509,6 mg jonów magnezu)

5 ml syropu zawiera 115,6 mg jonów wapnia i 25,5 mg jonów magnezu.

### 3. WYKAZ SUBSTANCJI POMOCNICZYCH

*substancje pomocnicze:*

sacharoza, kwas propionowy, sodu benzoesan, kwas solny rozcieńczony, aromat poziomkowy, woda oczyszczona.

### 4. POSTAĆ FARMACEUTYCZNA I ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

Syrop

150 ml

Kod EAN 5909990261314

### 5. SPOSÓB I DROGA PODANIA

Należy zapoznać się z treścią etykiety przed zastosowaniem leku.

#### Sposób i droga podania

Podanie doustne.

Syrop należy dawkować przy pomocy miarki dołączonej do opakowania.

Dorośli i młodzież: 15 ml 2 lub 3 razy na dobę.

Jeżeli lekarz nie zaleci innego dawkowania:

- dzieci od 2 do 6 lat: 5 ml 2 lub 3 razy na dobę,

- dzieci od 6 do 12 lat: 10 ml 2 lub 3 razy na dobę.

### 6. OSTRZEŻENIE DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA PRODUKTU LECZNICZEGO W MIEJSCU NIEWIDOCZNYM I NIEDOSTĘPNYM DLA DZIECI

Lek przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

**7. INNE OSTRZEŻENIA SPECJALNE, JEŚLI KONIECZNE****8. TERMIN WAŻNOŚCI****Termin ważności**

Nie stosować leku po upływie terminu ważności.

**9. WARUNKI PRZECHOWYWANIA****Warunki przechowywania**

Przechowywać w zamkniętych opakowaniach, w temperaturze nie wyższej niż 25°C.

**10. SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE USUWANIA NIEZUŻYTEGO PRODUKTU LECZNICZEGO LUB POCHODZĄCYCH Z NIEGO ODPADÓW, JEŚLI WŁAŚCIWE****11. NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO****Podmiot odpowiedzialny i wytwórca**

PPF HASCO-LEK S.A.

51-131 Wrocław, ul. Żmigrodzka 242 E

tel.: (22) 742 00 22,

e-mail: [informacjaoleku@hasco-lek.pl](mailto:informacjaoleku@hasco-lek.pl)

(Logo podmiotu odpowiedzialnego)

**12. NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU**

Pozwolenie nr R/2613

**13. NUMER SERII**

Numer serii

**14. OGÓLNA KATEGORIA DOSTĘPNOŚCI**

OTC - Lek wydawany bez recepty.

**15. INSTRUKCJA UŻYCIA****Syrop wapniowo-magnezowy****Wskazania do stosowania**

Profilaktyka i uzupełnianie niedoborów wapnia i magnezu w organizmie.

### **Przeciwwskazania**

Nadwrażliwość na substancje czynne lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. Podwyższone stężenie wapnia we krwi (hiperkalcemia). Podwyższone stężenie magnezu we krwi (hipermagnezemia). Zwiększone wydalanie wapnia w moczu (hiperkalciuria). Ciężka niewydolność nerek lub kamica nerkowa. Blok przedsionkowo-komorowy. Miastenia (*myasthenia gravis*). Zaburzenia wchłaniania, biegunka, galaktozemia.

### **Ostrzeżenia i środki ostrożności**

Zachować ostrożność stosując u osób z niewydolnością nerek i przyjmujących duże dawki witaminy D. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

### **Interakcje**

Wysokie dawki wapnia przyjmowane wraz z niektórymi lekami nasercowymi (glikozydami naparstnicy, np. digoksyną lub antagonistami wapnia, np. nifedypiną), mogą wywołać poważne zaburzenia czynności serca. Wapń znacznie zmniejsza wchłanianie niektórych antybiotyków (z grupy tetracyklin) oraz chinolonów, lewotyroksyny, nitrofurantoiny, bisfosfonianów, chloropromazyny, penicylaminy, leków obniżających krzepliwość krwi i związków fluoru. Dlatego zaleca się, aby odstęp pomiędzy przyjęciem syropu Wamag oraz wymienionych leków wynosił 2-3 godziny. Leki moczopędne z grupy tiazydów zmniejszają wydalanie, a witamina D zwiększa wchłanianie wapnia.

### **Ciąża i karmienie piersią**

Przed zastosowaniem leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty. Produkt stosowany w zalecanych dawkach nie wykazuje szkodliwego działania.

### **Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn**

Lek nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

### **Możliwe działania niepożądane**

Rzadko występują zaburzenia żołądkowo – jelitowe (zaparcia, biegunka).

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione na opakowaniu, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, tel.: 22 49 21 301, e-mail: [ndl@urpl.gov.pl](mailto:ndl@urpl.gov.pl). Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Odklej w celu uzyskania informacji o leku

## **16. INFORMACJA PODANA SYSTEMEM BRAILLE’A**

wamag

## **17. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – KOD 2D**

Nie dotyczy.

## **18. NIEPOWTARZALNY IDENTYFIKATOR – DANE CZYTELNE DLA CZŁOWIEKA**

Nie dotyczy.