

## Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla użytkownika

**Neo-angin szalwia, 1,2 mg + 0,6 mg + 5,9 mg, pastylki twarde**  
*Alcohol 2,4-dichlorobenzylicus + Amylmetacresolum + Levomentholum*

**Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.**

Lek ten należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- Jeśli potrzebna jest rada lub dodatkowa informacja, należy zwrócić się do farmaceuty.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie możliwe objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.
- Jeśli po upływie 3-4 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy skontaktować się z lekarzem.

### Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Neo-angin szalwia i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neo-angin szalwia
3. Jak stosować lek Neo-angin szalwia
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Neo-angin szalwia
6. Zawartość opakowania i inne informacje

### 1. Co to jest lek Neo-angin szalwia i w jakim celu się go stosuje

Neo-angin szalwia to lek w postaci pastylek twardych, zawiera dwie substancje czynne (alkohol 2,4-dichlorobenzylowy i amyloetakrezol) o działaniu antyseptycznym oraz lewomentol, który wywołuje uczucie chłodu na błonach śluzowych. Jednoczesne stosowanie substancji czynnych w leku Neo-angin szalwia powoduje ustąpienie bólu gardła i trudności w przełykaniu.

Neo-angin szalwia jest zalecany do wspomagania leczenia stanów zapalnych jamy ustnej i gardła, przebiegających z objawami, takimi jak: ból gardła, zaczerwienienie, obrzęk.

Jeśli po upływie 3-4 dni nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza.

### 2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Neo-angin szalwia

#### Kiedy nie stosować leku Neo-angin szalwia:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

#### Dzieci

Nie stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

#### Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania Neo-angin szalwia należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

- Jeśli u pacjenta występuje przewlekły kaszel lub chrypka, należy skontaktować się z lekarzem, zanim zastosuje się lek Neo-angin szalwia, ponieważ mogą to być objawy poważnej choroby.

#### Lek Neo-angin szalwia a inne leki

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Dotychczas nie stwierdzono występowania interakcji z innymi lekami.

### **Stosowanie leku Neo-angin szalwia z jedzeniem i pićm**

Brak danych dotyczących wpływu jedzenia i picia na działanie leku Neo-angin szalwia.

Nie zaleca się spożywania posiłku i picia bezpośrednio po zastosowaniu leku Neo-angin szalwia, aby uniknąć usunięcia substancji czynnych z powierzchni błony śluzowej jamy ustnej i gardła.

### **Ciąża i karmienie piersią**

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Brak wystarczających danych klinicznych dotyczących stosowania leku Neo-angin szalwia u kobiet w okresie ciąży.

Dlatego nie zaleca się stosowania leku Neo-angin szalwia u kobiet w ciąży i karmiących piersią.

### **Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn**

Nie przeprowadzono badań nad wpływem leku na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

### **Lek Neo-angin szalwia zawiera Ponceau 4R (E 124) i izomalt (E 953)**

Lek Neo-angin szalwia zawiera barwnik Ponceau 4R (E 124), który może powodować reakcje alergiczne.

Neo-angin szalwia zawiera 2,58 g izomaltu (E 953) - substancję słodzącą w jednej pastylce twardej, co odpowiada 6 kcal (26 kJ). Należy to wziąć pod uwagę u pacjentów z cukrzycą. Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku. Izomalt może mieć lekkie działanie przeczyszczające.

## **3. Jak stosować lek Neo-angin szalwia**

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek Neo-angin szalwia jest przeznaczony do doustnego stosowania.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 6 lat:

należy powoli ssać 1 pastylkę co 2-3 godziny.

Nie należy połykać pastylek w całości. Nie żuć.

Nie należy stosować więcej niż 6 pastylek w ciągu doby.

Jeśli objawy zakażenia jamy ustnej i gardła nasilą się lub nie ustąpią po 3-4 dniach, należy skontaktować się z lekarzem.

Leku Neo-angin szalwia nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 6 lat.

### **Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Neo-angin szalwia**

Po zastosowaniu znacznie większej dawki leku niż zalecana może wystąpić podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i przewodu pokarmowego. W przypadku wystąpienia działań niepożądanych wywołanych zastosowaniem większej niż zalecana dawki leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

### **Pominięcie zastosowania leku Neo-angin szalwia**

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem leku, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

#### **4. Możliwe działania niepożądane**

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Poniższe działania niepożądane mogą zostać zaobserwowane po zastosowaniu Neo-angin szalwia:

Bardzo rzadko:

- podrażnienie błony śluzowej jamy ustnej i przewodu pokarmowego

Częstość nieznana:

- reakcje alergiczne tj. obrzęk ust i języka

Ocenę działań niepożądanych dokonano na podstawie częstości ich występowania.

Bardzo często: u więcej niż u 1 na 10 osób

Często: u mniej niż u 1 na 10 osób

Niezbyt często: u mniej niż u 1 na 100 osób

Rzadko: u mniej niż u 1 na 1000 osób

Bardzo rzadko: u mniej niż u 1 na 10 000 osób

Częstość nieznana: częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych

#### **Zgłaszanie działań niepożądanych**

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceutce, lub pielęgniarce. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych: Al. Jerozolimskie 181C, 02-222 Warszawa, tel.: + 48 22 49 21 301, faks: + 48 22 49 21 309, strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

#### **5. Jak przechowywać lek Neo-angin szalwia**

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Przechowywać w temperaturze poniżej 30°C. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

#### **6. Zawartość opakowania i inne informacje**

##### **Co zawiera lek Neo-angin szalwia**

- Substancjami czynnymi leku są: alkohol 2,4-dichlorobenzylowy, amylometakrezol i lewomentol. Jedna pastylka twarda zawiera 1,2 mg alkoholu 2,4-dichlorobenzylowego, 0,6 mg amylometakrezolu i 5,9 mg lewomentolu.
- Pozostałe składniki to: izomalt (E 953), kwas winowy, olejek szalwiowy, olejek miętowy, żółcień chinolinowa (E 104), Ponceau 4R (E 124), błękit patentowy V (E 131).

##### **Jak wygląda lek Neo-angin szalwia i co zawiera opakowanie**

Pastylki twarde Neo-angin szalwia są okrągłe, barwy miodowej, lekko transparentne.

Pastyłki twarde Neo-angin szałwia są dostępne w blisterach w tekturowym pudełku.  
Wielkość opakowania: 12, 16, 24 lub 48 pastylek twardych.  
Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

**Podmiot odpowiedzialny i wytwórca**

Podmiot odpowiedzialny:  
M.C.M. Klosterfrau Healthcare Sp. z o.o.  
ul. Hrubieszowska 2  
01-209 Warszawa  
tel.: +48 22 231 8287  
e-mail: [biuro@klosterfrau.pl](mailto:biuro@klosterfrau.pl)

Wytwórca:  
Divapharma GmbH  
Motzener Str. 41  
D-12277 Berlin  
Niemcy

**Data ostatniej aktualizacji ulotki:**