

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta

Limfodrenaż-Pascoe Sensitiv krem

Homeopatyczny produkt leczniczy ze wskazaniami leczniczymi.

Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera ona informacje ważne dla pacjenta.

- Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.
- Lek ten przepisano ściśle określonej osobie. Nie należy go przekazywać innym. Lek może zaszkodzić innej osobie, nawet jeśli objawy jej choroby są takie same.
- Jeśli u pacjenta wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w tej ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Patrz punkt 4.

Spis treści ulotki:

1. Co to jest lek Limfodrenaż-Pascoe Sensitiv i w jakim celu się go stosuje
2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Limfodrenaż-Pascoe Sensitiv
3. Jak stosować lek Limfodrenaż-Pascoe Sensitiv
4. Możliwe działania niepożądane
5. Jak przechowywać lek Limfodrenaż-Pascoe Sensitiv
6. Zawartość opakowania i inne informacje

1. Co to jest lek Limfodrenaż-Pascoe Sensitiv i w jakim celu się go stosuje

Limfodrenaż-Pascoe Sensitiv jest lekiem homeopatycznym do stosowania zewnętrznego w terapii wspomagającej układ limfatyczny przy infekcjach górnych dróg oddechowych (nosa i gardła) oraz uszu.

2. Informacje ważne przed zastosowaniem leku Limfodrenaż-Pascoe Sensitiv

Kiedy nie stosować leku Limfodrenaż-Pascoe Sensitiv

- jeśli pacjent ma uczulenie na którąkolwiek z substancji czynnych lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku (wymienionych w punkcie 6).

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem stosowania leku Limfodrenaż-Pascoe Sensitiv należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą.

Obrzęki węzłów chłonnych mogą być spowodowane różnymi chorobami. Należy zasięgnąć porady lekarza, jeśli obrzęk (nawet jeśli występuje bez bólu) węzłów chłonnych utrzymuje się dłużej niż 2 tygodnie; jeśli występują objawy ostrego zapalenia (zaczerwienienie, ból, obrzęk, uczucie gorąca) lub w przypadku skrócenia oddechu, gorączki lub ropnego kaszlu.

Dzieci

Brak udokumentowanych badań dotyczących bezpiecznego stosowania u dzieci w wieku poniżej 12 lat. W związku z tym lek nie może być stosowany u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

Lek Limfodrenaż-Pascoe Sensitiv a inne leki

Nie są znane interakcje z innymi lekami, jednak w razie przyjmowania innych leków należy skonsultować się z lekarzem.

Należy poinformować lekarza lub farmaceutę o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych dostępnych bez recepty.

Limfodrenaż-Pascoe Sensitiv z jedzeniem, piciem i alkoholem

Na działanie leków homeopatycznych mogą wpływać negatywnie używki takie jak: alkohol, tytoń i kawa.

Ciąża i karmienie piersią

Brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania leku Limfodrenaż-Pascoe Sensitiv podczas ciąży i w okresie karmienia piersią, dlatego nie zaleca się stosowania leku w tym okresie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn

Nie dotyczy.

Lek Limfodrenaż-Pascoe Sensitiv zawiera alkohol cetylostearylowy

Może on wywołać miejscowe podrażnienie skóry (np. kontaktowe zapalenie skóry).

Ten lek zawiera 94 mg alkoholu (etanolu) w pasku kremu o długości 3 cm (11% w/w). Może powodować uczucie pieczenia na uszkodzonej skórze.

3. Jak stosować lek Limfodrenaż-Pascoe Sensitiv

Ten lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Sposób podania

Podanie na skórę.

Dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat:

Jeśli nie zalecono inaczej: należy wycisnąć z tuby 2-3 cm kremu i wmasować od 1 do 3 razy na dobę w obszarze powiększonych i bolesnych węzłów chłonnych.

Dzieci:

Lek Limfodrenaż-Pascoe Sensitiv nie powinien być stosowany u dzieci w wieku poniżej 12 lat.

4. Możliwe działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

W bardzo rzadkich przypadkach może wystąpić swędząca wysypka skórna, która znika po zaprzestaniu stosowania kremu. W takich przypadkach należy odstawić lek i skonsultować się z lekarzem.

Zgłaszanie działań niepożądanych

Jeśli wystąpią jakiegokolwiek objawy niepożądane, w tym wszelkie objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy powiedzieć o tym lekarzowi lub farmaceucie. Działania niepożądane można zgłaszać bezpośrednio do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

Al. Jerozolimskie 181 C

02-222 Warszawa

Tel.: + 48 22 49 21 301

Faks: + 48 22 49 21 309

Strona internetowa: <https://smz.ezdrowie.gov.pl>

Działania niepożądane można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.

Dzięki zgłaszaniu działań niepożądanych można będzie zgromadzić więcej informacji na temat bezpieczeństwa stosowania leku.

5. Jak przechowywać lek Limfodrenaż-Pascoe Sensitiv

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.

Nie należy stosować leku Limfodrenaż-Pascoe Sensitiv po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień danego miesiąca.

Okres ważności po pierwszym otwarciu tuby: 3 miesiące.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

6. Zawartość opakowania i inne informacje

Co zawiera lek Limfodrenaż-Pascoe Sensitiv

100 g kremu zawiera substancje czynne:

Conium maculatum D2	4,0 g
Calendula officinalis TM	2,0 g
Hydrargyrum biiodatum D5	0,1 g
Stibium sulfuratum nigrum D2	0,1 g

Substancje pomocnicze: woda oczyszczona, alkohol cetylostearylowy, emulgujący (typ A), etanol 86% (m/m), oleinian oleinowy, sorbitol ciekły, niekrystalizujący.

Jak wygląda lek Limfodrenaż-Pascoe Sensitiv i co zawiera opakowanie

Jednorodny biały krem pakowany w tuby po 20, 40 lub 100 g.

Nie wszystkie wielkości opakowań muszą znajdować się w obrocie.

Podmiot odpowiedzialny i wytwórca

Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH
Schiffenberger Weg 55
D- 35394 Giessen
Niemcy

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat tego leku należy zwrócić się do przedstawiciela podmiotu odpowiedzialnego:

Imis Pharma s.c.
ul. Św. Bonifacego 66/47
02-936 Warszawa
Tel. + 48 698 744 600
e-mail: office@imispharma.eu

Data ostatniej aktualizacji ulotki: